



**☆対応言語**

- (24時間365日対応可能)
- 英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・フランス語
- (10時~18時365日対応可能)
- タイ語・フィリピン語・ベトナム語・スペイン語
- ロシア語・ネパール語
- イングリッシュ

外国人から119番通報があった場合に、電話通訳センターを介して三者間で会話をを行い、必要な情報収集を行います。また、現場でも携帯電話を使用して三者間会話をを行うことが可能となっています。

### 三者間同時通訳サービスについて


上島町消防本部では、外国人からの119番通報の対応や、救急活動時ににおける外国人傷病者との会話を円滑に行うことを目的として、三者間同時通訳サービスや、スマートフォンを使用した多言語音声翻訳アプリを導入して消防活動を行っています。

共通言語で直接会話するより時間を要しますが、複数の手法により意思疎通を可能とし、活動が滞ることがないように整備を行っています。

外国人から119番通報があつた場合に、電話通訳センターを介して三者間で会話をを行い、必要な情報収集を行います。また、現場でも携帯電話を使用して三者間会話をを行うことが可能となっています。

## 外国人の119番対応について

### 三者間同時通訳の流れ



### 令和3年3月出動件数

地区	弓削	生名	岩城	魚島	その他	合計	R3累計
火災	0	0	0	0	0	0	0
救急	21	8	9	1	0	39	108

(令和3年3月31日現在)

上島町消防署 ☎ 77-4118

### ☆対応言語

英語・中国語・韓国語・タイ語・フランス語  
インドネシア語・ベトナム語・スペイン語  
マレー語・フィリピン語・ポルトガル語  
ロシア語・ネパール語・ドイツ語

救急ボイストラは、総務省所管の消防研究センターと情報通信研究機構が開発した救急隊用の多言語音声翻訳アプリです。通常の音声翻訳機能に加え、救急現場で使用頻度の高い会話内容を「定型文」として登録しており、外国語による音声と画面の文字による円滑なコミュニケーションを図ることが可能となっています。

### 多言語同時通訳翻訳アプリ「救急ボイストラ」について

**1 かんきつ開花期防除**  
かんきつは訪花害虫や灰  
色かび病の被害を受けると、  
果皮に傷が付き商品性が低  
下してしまいます。しっかりと  
防除して正品率を上げま  
しょう。

**2 苗木定植後の管理**  
今年は、かんきつの発芽  
は10日程度早まりました。  
この広報の原稿は3月末に  
作成しましたが、かんきつ  
の生育は順調でしょうか。  
平年よりも生育が進んでい  
る予想されますが、天候  
を見ながら農作業が遅れな  
いようにしてください。

**3 防除のタイミング**  
訪花害虫は3分咲きと8  
分咲の2回散布が基本にな  
ります。灰色かび病は、満  
開から落弁期が防除適期に  
なります。品種によって開花  
の早晚があるので、開花に  
応じて薬剤を散布しますが、  
中心品種に合わせて下さい。  
訪花害虫と灰色かび病を



ケシキスイ




ハナムグリ



灰色かび病



1か所1本に芽かき



3~4本の主枝候補枝

**1 芽かき**  
新植のかんきつ苗は、新  
梢が1か所から2~3本發  
生しますが、1か所1本に  
して2回散布が原則です。  
なお、降雨が多い場合には、  
落弁期に灰色かび病と黒点  
病防除を兼ねて追加防除を  
行います。

**2 苗木定植後の管理**  
1回の散布で済ませたい場  
合は、開花が5分~8分咲  
き程度になったところで混用  
散布します。気温が変動し  
果実に傷がついてしまいま  
す。花びらの落ちにくい温  
州みがんやはれひめ、レモン  
などは必ず防除を行いま  
しょう。湿度が高いとカビ  
が生えやすいため、開花期  
に雨が多い年は被害が多く  
なるので、落弁期に殺菌剤  
を散布し、枯死花弁にカビ  
が生えないようにします。

**3 支柱立て**  
新梢が伸びると風雨によ  
る欠損が心配されます。支  
柱を立て欠損を防止しま  
す。  
**② 防除・液肥散布**  
5月になると新葉にミカン  
ハモグリガの被害が出てきま  
す。2週間おきに防除を行  
いますが、その時には液肥  
を混用して生育促進を図り  
ましよう。  
**③ 支柱立て**  
芽かきをして新梢の伸びを  
良くしましょう(図1)。  
また、苗木では将来の樹  
形を3本主枝とするので、  
と開花が続くので、開花初  
めに訪花害虫剤を散布し、  
8分咲き満開期に訪花害  
虫剤と灰色かび病剤を混用  
して2回散布が原則です。  
なお、降雨が多い場合には、  
落弁期に灰色かび病と黒点  
病防除を兼ねて追加防除を  
行います。



かんきつ開花期防除  
苗木定植後の管理