

《子どもの予防接種一覧》

予防接種の種類		対象年齢	標準的な接種期間と回数	
ロタウイルス	1 価 (ロタリックス)	生後 6 週～24 週	1 回目:生後 2 か月から生後 14 週 6 日までに接種 2 回目:1 回目の接種から 27 日以上の間隔をおいて1回	
	2 価 (ロタテック)	生後 6 週～32 週	1 回目:生後 2 か月から生後 14 週 6 日までに接種。27 日以上の間隔をおいて 3 回 2・3回目:1 回目の接種から 27 日以上の間隔をおいて2回	
B 型肝炎		生後 1 歳未満	1 回目:接種開始が生後 2 か月～9 か月に至るまで 2 回目:1 回目の接種から 27 日以上の間隔で 1 回 3 回目:1 回目の接種から 139 日以上の間隔をおいて 1 回	
ヒブ		生後 2 か月～5歳未満	初回:接種開始が生後 2 か月～7 か月に至るまで 27 日(医師が認める場合は 20 日)～56 日の間隔で 3 回 追加:初回終了後、7 か月～13 か月の間隔をおいて 1 回	* 接種開始月齢により、接種回数が異なります。
小児用肺炎球菌		生後 2 か月～5歳未満	初回:接種開始が生後 2 か月～7 か月に至るまで 27 日以上の間隔で 3 回(生後 12 か月までに完了) 追加:初回 3 回目から 60 日以上の間隔をおいて生後 12 か月～15 か月までに 1 回	
四種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)		1期:生後 3 か月～7 歳 6 か月未満	1 期初回:生後 3 か月～12 か月に至るまで 20 日～56 日の間隔で 3 回 1 期追加:初回 3 回終了後、1 年～1 年 6 か月の間に 1 回	
BCG		生後 1 歳未満	生後 5 か月～8 か月に達するまでに 1 回	
水痘		生後 1 歳～3 歳未満	1 回目:1 歳～1 歳 3 か月 2 回目:1 回目の接種から 6～12 か月の間	
麻しん風しん		1 期:生後 12 か月～24 か月未満 2 期:就学前の学年	1 期:1 回 2期:1 回	
日本脳炎		1 期:生後 6 か月～7 歳 6 か月未満	1 期初回:3 歳～4歳に達するまでの間 6 日～28 日の間隔で2回 1 期追加:4 歳～5歳に達するまでの間 1 期追加終了後、おおむね 1 年後に 1 回 2 期 :9 歳～10 歳に達するまでの間に1回	* 特例対象者 平成 7 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの方は、20 歳未満までの間は、定期接種として接種可能です。
2 種混合 (ジフテリア、破傷風)		2 期:11 歳～13 歳未満	11歳の間に1回	
HPV ワクチン (子宮頸がん 予防)	シルガード 9 (9 価ワクチン)	小学 6 年生～高校 1 年生相当の年齢 の女子	(15 歳未満)1 回目の接種から6か月後に 2 回目を接種 (15 歳以上)1 回目の接種から 2 か月後に2回目を接種 1 回目の接種から6か月後に 3 回目を接種	*平成 9 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの女性のうち、ワクチン接種の積極的勧奨が差し控えられていた時期に、接種機会を逃した方も、9 価ワクチンを公費で接種できます。 *ワクチンの種類や接種年齢により、接種回数や間隔が異なります。どのワクチンを接種するかは、医師にご相談ください。
	サーバリックス (2 価ワクチン)		1回目の接種から 1 か月後に2回目を接種 1 回目の接種から 6 か月後に 3 回目を接種	
	ガーダシル (4価ワクチン)		1 回目の接種から2か月後に 2 回目を接種 1 回目の接種から 6 か月後に 3 回目を接種	